



**OXY'PHARM®**

917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

## NOTICE TECHNIQUE

### OXYPY+

#### DEFINITION ET CARACTERISTIQUES

- **OXYPY+®** est un produit de BIO-désinsectisation pour usage intérieur, à utiliser spécifiquement pour les traitements contre puces et **punaises de lit**.
- **OXYPY+®** est une solution prête à l'emploi, conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion NOCOSPRAY® et NOCOMAX®.
- **OXYPY+®** est fourni avec un pulvérisateur à fixer sur la bouteille pour les applications locales.

#### REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Conditionnement : 1L et 20L

Référence	Conditionnement
4230.001	1 litre
4230.020	20 litres

#### CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
- Délai de validité :  
Dans l'emballage d'origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication  
Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture



**OXY'PHARM®**

917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

## MODE D'EMPLOI

### **Premier traitement :**

- ⇒ Inscrire la date d'ouverture sur le flacon avant la première utilisation
- ⇒ Agiter le flacon avant chaque utilisation
- ⇒ Visser le flacon sur l'appareil de diffusion NOCOSPRAY® ou NOCOMAX®
- ⇒ Enlever le matelas du lit et mettre en évidence toutes les parties difficilement accessibles
- ⇒ Nettoyer - si possible avec un système vapeur - tous les tissus, bois de lit et structures apparentes où les œufs de punaises peuvent se déposer puis aspirer avec soin (avec un aspirateur)
- ⇒ Appliquer le produit dans tous les recoins du lit à l'aide du pulvérisateur fourni
- ⇒ Laisser le matelas sur la tranche et commencer ensuite le traitement de la pièce
- ⇒ Régler l'appareil sur le volume de la pièce x2  
(Par exemple : pour une pièce d'un volume de 50m<sup>3</sup>, régler sur 100m<sup>3</sup>)
- ⇒ 2 heures après la fin de la diffusion, aérer la pièce (en ouvrant la fenêtre) pendant 10 minutes
- ⇒ Retirer la bouteille après utilisation et la refermer

***Il est conseillé de procéder ensuite à des traitements d'entretien préventifs toutes les 6 semaines.***

### **Traitement d'entretien :**

Suivre les mêmes instructions que pour le premier traitement sauf pour le réglage de l'appareil :

- ⇒ Régler l'appareil sur le volume réel de la pièce

**A NOTER :** Pendant toute la durée du traitement, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.

Lors de l'application manuelle du produit avec le pulvérisateur, utiliser des protections appropriées (cf. FDS produit)

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur notre site Internet [www.oxypharm.net](http://www.oxypharm.net)

**Version : D**

**Date de dernière mise à jour : 20/07/2011**

[www.oxypharm.net](http://www.oxypharm.net)

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros • SIREN 448 974 253 • R.C.S. Créteil • APE 4646 Z • N° TVA Intracommunautaire : FR 74 448 974 253